

۱۴۴۷۲۸۲

سید

بررسی توصیفی نتایج آپاندکتومی در بیماران ترومایی منجر به لاپاراتومی در بیمارستان

طالقانی شهر کرمانشاه در سالهای ۹۳-۱۳۹۱

دکتر بهنام رستمی

www.ketab.ir

سرشناسه	مخصوصی، بهنام رضا، ۱۳۵۶ -
عنوان و نام پدیدآور	بررسی توصیفی نتایج آپاندکتومی در بیماران ترومایی منجر به لاپاراتومی در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه در سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۳ بهنام رضا مخصوصی.
مشخصات نشر	تهران فرهنگ زبرجد ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری	۳۹ ص.
شابک	978-600-6827-58-2 : ۳۵۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی	فیا
موضوع	شکم - جراحی - عوارض و عواقب
موضوع	Abdomen -- Surgery -- Complications
موضوع	آپاندیس برداری - ایران - نمونه پژوهی
موضوع	Appandectomy -- Iran -- Case studie
رده بندی کنگره	۱۳۹۵ ب ۳۳۴ / م ۵۴۰ RD۵۴۰
رده بندی دیویی	۶۱۷ ۵۰۵
شماره کتابشناسی ملی	۴۴۳۵ ۱۴

عنوان : بررسی توصیفی نتایج آپاندکتومی در بیماران ترومایی منجر به لاپاراتومی در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه در سالهای ۹۳-۱۳۹۱.

مؤلف : دکتر بهنام رضا مخصوصی

ناشر : فرهنگ زبرجد

مدیر مسئول : مجتبی زبرجدی شهریار

نوبت و سال چاپ : اول - ۱۳۹۵

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۲۷-۵۸-۲

صفحه آرایشی : مهدی رادمهر

چاپ و صحافی : تایماز

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

فروشگاه و مرکز پخش : تهران - خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - نرسیده به خ روانمهر - پلاک ۲۳۳

تلفن : ۶۶۴۹۶۹۳۵ - ۰۲۱ دورنگار : ۶۶۴۸۲۳۵۸ - ۰۲۱



فهرست مطالب

۶	چکیده
۷	فصل اول: مقدمه
۸	مقدمه
۹	لاپاراتومی (Laparotomy)
۱۰	شایع ترین خطرات و عوارض احتمالی عمل جراحی لاپاراتومی
۱۰	آپاندکتومی اتانقی
۱۲	مکانیسم احتمالی ایجاد آپاندیست حاد در بیماران ترومایی
۱۲	بررسی متون
۱۴	اهداف و فرضیات
۱۴	اهداف اصلی
۱۴	اهداف ویژه
۱۵	سوالات پژوهشی
۱۶	اهداف کاربردی
۱۷	فصل دوم: روش اجرا
۱۸	روش اجرا
۱۸	معیارهای خروج از مطالعه
۲۱	فصل سوم: نتایج
۲۲	نتایج
۳۱	فصل چهارم: بحث
۳۲	بحث و نتیجه گیری
۳۴	نتیجه گیری
۳۵	منابع
۳۹	Abstract

چکیده

زمینه و هدف: آپاندیسیت یکی از شایع‌ترین علل عمل‌های جراحی اورژانس می‌باشد. علل مختلفی می‌تواند باعث ایجاد آپاندیسیت شود از جمله فکالیت، هیپرتروفی پلاک پی‌یر، دانه میوه‌ها و انگل‌ها. یکی از انواع نه‌چندان معمول آپاندیسیت نوع تروماتیک می‌باشد. مواردی از بروز آپاندیسیت حاد پس از تروما گزارش شده است با توجه به شیوع بالای آپاندیسیت و میزان پارگی آن در موارد ملتهب که در حدود ۶۰ درصد موارد (به ویژه در اطفال) می‌باشد و همچنین گستردگی تابلوی بالینی این بیماری و گزارش برخی موارد ابتلا به آپاندیسیت پس از ترومای شکم، این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع آپاندیسیت پس از تروما در بیمارانی که به دلیل ترومای شکم تحت لاپاراتومی قرار می‌گیرند، انجام گرفته است.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی است که بر روی کلیه بیماران ترومای شکم (نافذ و غیر نافذ) و با تابلوی شکم، درد شکم بستری گردیدند که با نظر جراح معالج و با تشخیص شکم حاد به صورت اورژانسی تحت لاپاراتومی قرار گرفتند و بر اساس انجام آپاندکتومی یا عدم انجام آن به دو گروه درآمد و شاهد تقسیم شدند اطلاعات توسط پرسشنامه طراحی شده جمع‌آوری گردید و تحلیل اطلاعات استفاده از آمارهای توصیفی انجام گردید. **نتایج:** در این پژوهش از ۵۳۵ بیمار مورد بررسی، ۳۲۹ نفر (۶۱/۴٪) مرد و ۲۰۶ نفر (۳۸/۵٪) زن بودند. تعداد بیماران ترومای نافذ ۱۰۷ نفر (۲۰/۱٪) و ترومای غیرنافذ ۴۲۸ بیمار (۸۰٪) تحت لاپاراتومی قرار گرفته بودند، از ۵۳۵ بیمار مورد بررسی، ۳۴۳ نفر بیمار آپاندکتومی و ۱۹۲ نفر بیمار غیرآپاندکتومی شدند. از ۳۴۳ بیمار تحت عمل آپاندکتومی قرار گرفته بودند ۶ نفر نتیجه پاتولوژی آنها آپاندیسیت مثبت بود که از این تعداد ۵ نفر مرد و ۱ نفر زن و بیشتر آنها در رده سنی زیر ۱۸ سال قرار داشتند. از این تعداد بیمار ۵ مورد ترومای غیرنافذ و ۱ مورد ترومای نافذ بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه داد که شکم حاد شایع‌ترین علت لاپاراتومی اورژانسی بوده که منجر به لاپاراتومی شده است. در بیماران ترومایی، ترومای غیرنافذ (تصادف باموتورسیکلت) بیشترین عامل لاپاراتومی اورژانسی بود.

واژه‌های کلیدی: آپاندیسیت، تروما، شیوع.