

۲۵۸ ۳۷۵۱

بررسی عوامل مرتبط با شدت واریس اندام تحتانی پرستاران شاغل در

بیمارستان های آموزشی تحت تابع دانشگاه علوم پزشکی خراسان

شمالی سال ۱۳۹۵



سرشناسه

عنوان و نام پدیدآور

: بشیریان، سولماز، ۱۳۶۴ -

: بررسی عوامل مرتبط با شدت واریس اندام تحتانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی تحت تابع دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال ۱۳۹۵ / مولفین سولماز بشیریان، سمانه نودهی.

مشخصات نشر

: تهران: سنجش و دانش، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری

: ۱۵۲ص: جدول، نمودار.

شابک

: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۹-۳۸۷-۵

وضعیت فهرست نویسی

: فیبا

یادداشت

: کتابخانه

موضوع

: واریس -- ایران -- نمونه‌پژوهی

موضوع

: Varicose veins -- Iran -- Case studies

موضوع

: پرستاران -- ایران -- بیماری‌ها -- نمونه‌پژوهی

موضوع

: Nurses -- Iran -- Diseases -- Case studies

شناسه افزوده

: نودهی، سمانه، ۱۳۹۶

رده بندی کنگره

: RC ۳۹۶۶۹۵ ۴ب ۴

رده بندی دیویی

: ۱۴۳/۶۱۶

شماره کتابشناسی ملی

: ۵۰۴۱۹۰۵

بررسی عوامل مرتبط با شدت واریس اندام تحتانی پرستاران شاغل در بیمارستان

های آموزشی تحت تابع دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۱۳۹۵

سولماز بشیریان-سمانه نودهی

مولفین::

انتشارات سنجش و دانش

ناشر:

۵۰ نسخه

تیراژ:

اول، ۱۳۹۶

توبت چاپ:

۹۷۸-۶۰۰-۴۶۹-۳۸۷-۵

شابک:

آدرس: خ دانشگاه - تقاطع روانمهر - ساختمان سنجش و دانش پ ۱۲۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ می باشد.

خلاصه پژوهش:

مقدمه: واریس وریدی به عنوان شایع ترین بیماری های عروقی شناخته شده است که عوارض متعددی به همراه دارد. از آنجایی که این بیماری به سختی درمان می شود و برای جامعه بار مالی و مرگ و میر زیادی دارد، مطالعات زیادی خطر عوامل پدید آورنده بیماری را در جوامع مختلف مورد بررسی قرار می دهند. روش: از پرستاران داوطلب شرکت کننده خواسته شد تا ابتدا آنها به واریس عروق توسط یک متخصص قلبی عروقی تأیید شود و سپس در واریس آنها با استفاده از معیار CEAP مشخص شد. پس از معاینه از یک پرسشنامه محقق ساخته چهار قسمتی که شامل عوامل دموگرافیک، شغلی، کیفیت زندگی و سبک زندگی است، پرسشنامه پرستاران تکمیل شد. یافته ها: عوامل جنس، سن، بارداری، تعداد فرزندان، سابقه خانوادگی، استرس، نشستن، راه رفتن، وزن، BMI، اضافه کار، سابقه کار، به طور معنی داری روی شدت واریس تأثیر دارند. رگرسیون لجستیک چندگانه نشان می دهد که ایستادن ($OR=13.85$)، نشستن ($OR=4.85$)، بارداری ($OR=2.02$)، سن ($OR=1.219$) و اضافه کار ($OR=1.029$)، مؤثرترین عوامل دموگرافیک و شغلی هستند. عوامل شغلی و دموگرافیک تعدیل شده با سن و جنس نشان می دهد که تنها عامل بارداری تحت تأثیر قرار گرفته است. عوامل سبک زندگی نشان می دهد که فعالیت فیزیکی ($OR=4.38$)، کنترل وزن و تغذیه ($OR=3.76$)، تأثیر روی شدت واریس دارند. همچنین در این مطالعه بین شدت علائم شدت واریس ارتباط معناداری دارد ($OR=4.048$). نتیجه گیری: این مطالعه عوامل خطرزای شغلی روی واریس وریدی را مشخص می کند که می تواند در بهبود محیط کاری و کیفیت زندگی پرستاران در طولانی مدت مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب:

۱۲	فصل اول :
۱۲	طرح پژوهش
۱۳	مقدمه
۱۴	۱-۱- بیان مسأله
۲۷	۱-۲- اهداف، سوالات و فرضیه پژوهش
۲۷	۱-۲-۱- اهداف اصلی پژوهش:
۲۷	۱-۲-۱- اهداف فرعی پژوهش:
۲۸	۱-۲-۳- اهداف کاربردی پژوهش:
۲۸	۱-۳- سوالات پژوهش
۲۸	۱-۵- تعاریف نظری و عملی واژه ها:
۲۸	۱-۵-۱- تعریف نظری وریدهای واریسی
۲۹	۱-۵-۲- تعریف عملی وریدهای واریسی:
۲۹	۱-۵-۳- تعریف عملی شدت واریس:
۳۰	۱-۵-۴- تعریف عملی عوامل مرتبط:
۳۰	۱-۶- نوآوری پژوهش:
۳۱	۱-۷- سازمان های همکار با این پژوهش:
۳۲	فصل دوم :
۳۲	بررسی متون
۳۳	۱-۲- مروری بر متون
۳۳	۱-۱-۲- بررسی متون فارسی:
۴۷	۱-۲-۲- بررسی متون انگلیسی:
۵۴	۱-۲-۲- چارچوب پژوهش
۵۴	۱-۲-۲- وریدهای واریسی:
۵۶	۱-۲-۲- شدت واریس:
۵۷	۱-۲-۲- نارسایی مزمن وریدی (CVI):
۵۸	۱-۲-۲- ارزیابی بالینی سیستم وریدی:

۶۲	۲-۲-۴-۱- ارزیابی غیر تهاجمی:
۶۲	۲-۲-۴-۲- ارزیابی تهاجمی:
۶۳	۲-۲-۵- درمان وریدهای واریسی:
۶۶	۲-۲-۶- سبک زندگی (LifeStyle):
۶۹	۲-۲-۷- بهداشت کار:
۶۹	۲-۲-۸- بیماری های ناشی از کار:
۷۰	۲-۲-۹- بیماری های مرتبط با کار:
۷۲	فصل سوم :
۷۲	روش تحقیق
۷۳	۳-۱- نوع مطالعه:
۷۳	۳-۲- جامعه پژوهش:
۷۳	۳-۳- محیط پژوهش:
۷۳	۳-۴- نمونه پژوهش:
۷۴	۳-۵- روش نمونه گیری:
۷۴	۳-۶- حجم نمونه و روش محاسبه آن:
۷۵	۳-۷- مشخصات واحد پژوهش:
۷۵	۳-۷-۱- معیارهای ورود به پژوهش:
۷۵	۳-۸-۱- ابزار گردآوری داده ها و روش استفاده از آن:
۷۶	۳-۸-۱-۱- مقیاس اندازه گیری CEAP
۷۷	۳-۸-۲- پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و شغلی:
۷۷	۳-۸-۳- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ):
۷۸	۳-۸-۴- پرسشنامه تخصصی واریس وریدی آبردین AVVQ:
۷۹	۳-۹- اعتبار علمی (روایی) و اعتبار علمی (پایایی) ابزارها:
۷۹	۳-۹-۱- پرسشنامه خود ساخته پژوهشگر:
۸۱	۳-۱۰- روش اجرای پژوهش:
۸۳	۳-۱۱- تجزیه و تحلیل داده ها:
۸۳	۳-۱۲- محدودیت های اجرای پژوهش:
۸۴	۳-۱۳- ملاحظات اخلاقی:
۸۵	فصل چهارم

: یافته ها

- ۸۵
- ۸۷ ۱-۴- فراوانی نمونه ها براساس شدت واریس
- ۱۰۳ ۲-۴- ارتباط شدت واریس با متغیرهای کمی:
- ۱۱۰ فصل پنجم :
- ۱۱۰ بحث و نتیجه گیری
- ۱۱۱ ۱-۵- بحث و بررسی یافته ها:
- ۱۱۱ ۱-۱-۵- ارتباط جنسیت با شدت واریس:
- ۱۱۳ ۲-۱-۵- ارتباط بارداری، زایمان، تعداد دفعات سقط، تعداد فرزند با شدت واریس:
- ۱۱۵ ۳-۱-۵- ارتباط معیت تأهل با شدت واریس:
- ۱۱۵ ۴-۱-۵- اثر مصرف قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی با شدت واریس:
- ۱۱۶ ۵-۱-۵- ارتباط یائسگی با شدت واریس:
- ۱۱۷ ۶-۱-۵- ارتباط تحصیلات با شدت واریس:
- ۱۱۷ ۷-۱-۵- ارتباط مسکن و نورالژنیک، پیمانی، قراردادی، شرکتی و ... با شدت واریس:
- ۱۱۸ ۸-۱-۵- ارتباط تعداد دفعات اجابت مزاج با شدت واریس:
- ۱۱۸ ۹-۱-۵- ارتباط سن و سابقه کار با شدت واریس:
- ۱۱۹ ۱۰-۱-۵- ارتباط وزن و BMI با شدت واریس:
- ۱۲۰ ۱۱-۱-۵- ارتباط سابقه خانوادگی با شدت واریس:
- ۱۲۱ ۱۲-۱-۵- ارتباط ایستادن، راه رفتن و نشستن با شدت واریس:
- ۱۲۳ ۱۳-۱-۵- ارتباط شب کاری با شدت واریس:
- ۱۲۴ ۱۴-۱-۵- ارتباط اضافه کار با شدت واریس:
- ۱۲۴ ۱۵-۱-۵- بررسی عوامل شغلی و دموگرافیک با رگرسیون لجستیک
- ۱۲۵ ۲-۵- ارتباط واریس با فاکتورهای سبک زندگی:
- ۱۲۵ ۱-۲-۵- ارتباط سلامت جسمانی- ورزش و تندرستی با شدت واریس:
- ۱۲۶ ۲-۲-۵- کنترل وزن و تغذیه:
- ۱۲۷ ۳-۲-۵- سلامت اجتماعی:
- ۱۲۸ ۴-۲-۵- سلامت روان شناختی و سلامت معنوی:
- ۱۲۸ ۵-۲-۵- اجتناب از مواد مخدر و داروها:
- ۱۲۹ ۳-۵- ارتباط شدت علائم با شدت واریس:
- ۱۳۰ ۴-۵- نتیجه گیری نهایی:

۱۳۱ ۵-۵- کاربرد یافته ها:

۱۳۱ ۵-۶- پیام پژوهش:

۱۳۱ ۵-۷- پیشنهاد برای پژوهش های بعدی:

۱۳۳ رفرنس ها:

www.ketab.ir