

خودمراقبتی و آزمایش اچ آی وی، و عوامل مؤثر در پیشگیری ایدز

نویسنده: آوری و تالیف:
نیدش نفی و همکاران



ناشر:
پارسی سلامت

تابستان ۱۳۹۵

سرشناسه	: شریفی، نوید، ۱۳۵۸ -
عنوان و نام پدیدآور	: خودمراقبتی و آزمایش اچ‌آی‌وی، دو عامل مؤثر در پیشگیری ایدز / گردآوری و تألیف نوید شریفی و همکاران.
مشخصات نشر	: تهران: پارسای سلامت، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری	: ۶۴ ص.: مصور (رنگی)، جدول (رنگی)؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س.م.
شابک	: ۲-۳-۹۵۸۰۱-۶۰۰-۹۷۸-۷۰۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
موضوع	: ایدز — پیشگیری
موضوع	: AIDS (Disease) — Prevention
موضوع	: عفونت‌های اچ. آی. وی. — تشخیص
موضوع	: HIV Infections — Diagnosis
موضوع	: اچ. آی. وی (ویروس) — انتقال
موضوع	: HIV (Viruses) — Transmission
موضوع	: ایدز — بیماران — پرستاری و مراقبت
موضوع	: AIDS (Disease) — Patients — Care
رده بندی کنگره	: ۱۳۶۵ ۳۷ش ۹الف / RA۶۴۴
رده بندی دیویی	: ۶۱۰/۹۷۰
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۱۰۷۹۷

خودمراقبتی و آزمایش اچ‌آی‌وی، دو عامل مؤثر در پیشگیری ایدز

گردآوری و تألیف: نوید شریفی و همکاران

ناشر: پارسای سلامت

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۵

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

تلفن تماس: ۰۲۱-۴۴۲۱۰۲۶۹


فصل اول: صفحه ۷

انگ و تبعیض نسبت به مبتلایان به
اچ آی وی / ایدز



فصل دوم: صفحه ۱۴

اچ آی وی و باورهای نادرست



فصل سوم: صفحه ۲۱

خانواده و نقش آن در پیشگیری از
اچ آی وی



فصل چهارم: صفحه ۲۸

پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به
فرزند



فصل پنجم: صفحه ۳۵

مراکز مشاوره، بیمه، رفتار



فصل ششم: صفحه ۴۲

راه های انتقال و عدم انتقال و پیوستگی
از انتقال جنسی اچ آی وی



فصل هفتم: صفحه ۵۰

مواد محرک و اچ آی وی / ایدز



فصل هشتم: صفحه ۵۷

مواد مخدر و اچ آی وی / ایدز



بیش از سه دهه از شناخت اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز می‌گذرد. همه‌گیری جهانی ایدز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی انسان به خصوص نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهد. در حال حاضر در سطح جهان بالغ بر ۳۶ میلیون نفر از جمله بیش از دو میلیون کودک با اچ‌آی‌وی زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۱۴ میلادی ۲ میلیون نفر در دنیا به اچ‌آی‌وی مبتلا شدند؛ این به آن معناست که روزانه حدود ۵۶۰ نفر در جهان به این بیماری مبتلا شدند.

در جهان تاکنون حدود ۳۴ میلیون نفر به علت ابتلا به ایدز جان خود را از دست داده‌اند. طی ۱۵ سال گذشته مرگ و میر ناشی از ایدز در میان نوجوانان سه برابر شده است. به طوری که بیماری ایدز اولین عامل مرگ و میر نوجوانان در آفریقا و جنوب آسیا و علت فوت این رده سنی در سطح جهان به حساب می‌آید (۱).

اثرات اجتماعی و بهداشتی آلودگی بر جوامع بشری و به ویژه اثر بر سلامت انسان با آن شده است تا آلودگی مورد توجه دانشمندان قرار گیرد.

ارتباطات جنسی محافظت نشده علاوه بر انتقال اچ‌ای‌وی می‌تواند باعث انتشار بیش از ۳۰ بیماری، زخمی شناخته شده نظیر سوزاک، سیفلیس و ... گردد. افرادی که در معرض خطر این بیماری‌ها قرار دارند تا حدود بسیار زیادی رفتارهای مشابه دارند. از طرف دیگر وجود یک عفونت آمیزشی، خطر ابتلا به اچ‌ای‌وی را افزایش می‌دهد. به طوری که خطر انتقال اچ‌ای‌وی در یک زوج جنسی که یکی از آنها مبتلا به نوعی عفونت آمیزشی است ۱۰ برابر بیشتر از زمانی است که هیچ یک از طرفین، مبتلا به عفونت آمیزشی نیستند (۲).

ذکر این نکته ضروریست که امروزه پیشرفت های زیادی در خصوص تشخیص و درمان اچ آی وی حاصل شده است، ولی همان طور که در مورد همه بیماری ها همیشه پیشگیری مقدم بر درمان است در مورد ایدز هم پیشگیری از ابتلاء در الویت است و خود مراقبتی نقش بسیار مهمی برای پیشگیری از ابتلاء افراد به بیماری های آمیزشی و ایدز دارد.