

۱۵۲۳۵۶

بررسی قابلیت اجرایی رهنمود بالینی
«سل و سل همراه با اچ. آی. وی. در زندان‌ها»

گزارش نهایی عملکرد در نگاه تهران بزرگ
(زندان حسرت‌آباد)

www.ketab.ir

سرشناسه: فرهودی، بهنام

عنوان و نام پدیدآور: بررسی قابلیت اجرایی رهنمود بالینی سل و سل همراه با اچ.آی.وی. در زندان‌ها: گزارش نهایی عملکرد در ندامتگاه تهران بزرگ.../ نویسندگان بهنام فرهودی، سیداحمد سیدعلی‌نقی.

مشخصات نشر: تهران: اوسانه، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری: ۱۹۲ص.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۵۱-۱-۵

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: کتابنامه: ص. [۱۳۳] - ۱۴۰.

عنوان دیگر: گزارش نهایی عملکرد در ندامتگاه تهران بزرگ (زندان حسن‌آباد) شهریور ۱۳۹۵.

موضوع: سل -- ایران -- بیماران -- گزارش‌های بالینی

موضوع: Tuberculosis -- Patients -- Iran -- Case studies

شناسه افزوده: سیدعلی‌نقی، احمد، ۱۳۵۸ -

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۶ ۴۹۴ الف / RC۳۱۷

رده‌بندی دیویی: ۶۱۶/۹۹۵۰۹۵۵

شماره کتابشناسی ملی: ۴۷۸۹۸۱۳



اوسانه
Osaneh

بررسی قابلیت اجرایی رهنمود بالینی

«سل و سل همراه با اچ.آی.وی. در زندان‌ها»

نویسندگان: دکتر بهنام فرهودی، دکتر سیداحمد سیدعلی‌نقی

ناشر: اوسانه

چاپ نخست ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰ نسخه

قیمت: رایگان

حروف‌چینی: اوسانه/ لیتوگرافی: سایان گرافیک

چاپ و صحافی: سپیدار

ویراستار: اوسانه / طراح جلد: محمدمهدی صنعتی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۵۱-۱-۵

نشانی: تهران، شمال غرب پل سیدخندان، خیابان شقایق، پلاک ۲۴

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۲۳۰۸، ۰۲۲۸۹۲۱۴۳

اطلاعات ناشر در:

www.iketab.com و http://ketab.ir/osaneh

همه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۷	تقدیر و تشکر
۹	چکیده فارسی
۱۱	فصل اول. مقدمه و بیان مسئله
۱۱	۱-۱. مقدمه
۱۴	۱-۲. بیان مسئله
۱۵	فصل دوم. بررسی متون
۲۹	فصل سوم. مواد و روش کار
۶۳	فصل چهارم. یافته‌ها
۱۱۱	فصل پنجم. بحث و نتیجه گیری
۱۳۳	منابع
۱۴۱	پیوست‌ها
۱۴۷	بخش اول: اچ. آی. وی.
۱۵۹	بخش دوم: سل
۱۷۳	بخش سوم: استعمال، مراقبت پس از خروج از بیمارستان

چکیده فارسی

مقدمه و هدف. شیوع سابقه مصرف تزریقی مواد و ابتلا به اچ.آی.وی. در زندانیان زیاد است. تراکم جمعیت در زندان‌ها زیاد است و می‌تواند زندانیان را به سل مستعد کند. زندان می‌تواند به عنوان مخزنی مهم برای سل عمل کند و منجر به گسترش سل از زندانیان مبتلا به سل که شناسایی نشده یا به‌خوبی درمان نشده‌اند، به سایر زندانیان، ملاقات‌کنندگان، کارکنان یا پس از آزادی، به مردم شود. بنابراین، لازم است با طراحی مطالعه‌ای مداخله‌ای، قابلیت اجرایی و اثرات رهنمود بالینی «سل و سل همراه با اچ.آی.وی. در زندان‌ها» را بر شاخص‌های کشوری سل و سل همراه با اچ.آی.وی. بررسی کرد. به این منظور، از ابتدای آبان ۱۳۹۲ تا پایان خرداد ۱۳۹۳ این مطالعه مداخله‌ای در قالب طرحی در ندامتگاه تهران بزرگ انجام شد.

روش کار. این رهنمود بالینی، ارائه فعالیت خدمات در همه جنبه‌های تشخیص، مراقبت و درمان سل و اچ.آی.وی را شامل می‌شود. پیش از اجرای رهنمود، بحث گروهی متمرکز با حضور کارشناسان بیماری‌ها و با هدف شناسایی موانع رهنمود بالینی «سل و سل همراه با اچ.آی.وی. در زندان‌ها» در زندان برگزار شد. پس از تایید برای این بحث گروهی، رهنمود بالینی بالا اصلاح شد. در ندامتگاه تهران بزرگ، زندان یا تیپ‌های مختص، شامل سه تیپ یا زندان وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها قرنطینه یا محل تازه‌واردها است. ابتدا پزشک زندانیان تازه‌وارد در این بخش صورت می‌گیرد و سپس بر اساس وضعیت قانونی، به بندهای دیگر فرستاده می‌شوند.

یک زندان در استان البرز نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شد. بیماریابی فعال^۱ سل و اچ.آی.وی. در بخش قرنطینه، زندان شماره یک و زندان شماره دو ندامتگاه تهران بزرگ به روش «شروع آزمایش داوطلبانه اچ.آی.وی. به وسیله ارائه دهندگان خدمات^۲» آغاز شد. سه نفر از کارکنان کلینیک مثلثی درباره علایم سل و راه‌های انتقال اچ.آی.وی. با زندان آموزش دادند. در قرنطینه، همه زندانیان ورودی از نظر عوامل خطر اچ.آی.وی. و علایم سل بررسی شدند و به آنها که عوامل خطر را داشتند، آزمایش اچ.آی.وی. پیشنهاد^۳ شد. برای افرادی که نتایج آزمایش سریع آنها مثبت بود، ضمن پیگیری تأیید وضعیت اچ.آی.وی.، فرایندهای مراقبت و درمان و پیگیری‌های مربوط شروع شد. آنهایی که علایم سل داشتند نیز بر اساس راهنمای کشوری از نظر بیماری سل ارزیابی شدند. بیماریابی فعال داخل بند در زندان شماره یک را یکی از کارکنان کلینیک مثلثی به همان روش بیماریابی فعال داخل بند در قرنطینه انجام داد و در زندان شماره دو، بیماریابی فعال داخل بند را ارباطان بهداشتی انجام دادند. همچنین، درمان سل و اچ.آی.وی. با روش درمان تحت نظارت

^۱ Active Case Finding

^۲ Provider Initiated Voluntary Testing

^۳ Offer

مستقیم^۴ آغاز شد. پیگیری‌های پس از خروج برای زندانیان آزادشده، برای وصل کردن آنها به خدمات مراقبت و درمان در خارج از زندان، انجام شد. برای مقایسه نتایج در دو زندان، چهل شاخص کشوری سل و اچ.آی.وی، تعریف و استفاده شد.

یافته‌ها. رهنمود بالینی با موفقیت اجرا شد. ۲۸۶۰ نفر زندانی علایم خطر اچ.آی.وی، یا علایم مشکوک به سل داشتند. در مجموع، در دوره اجرای مداخله طرح، ۹ نفر مبتلا به سل و ۸۵ نفر اچ.آی.وی، مثبت تشخیص داده شدند که با توجه به میانه جمعیت حاضر در زندان (۶۹۰۰ نفر)، به ترتیب بیانگر بروز ۲۲۳/۶ در صدهزار نفر در سال برای سل و شیوع ۱/۲ درصد برای اچ.آی.وی، است. تفاوت‌های آماری معناداری در اکثر شاخص‌های مهم تعریف‌شده سل و اچ.آی.وی، بین دو زندان وجود داشت.

نتیجه‌گیری. با توجه به قابلیت اجرایی این رهنمود بالینی و نتایج معنادار آن، محققان پیشنهاد می‌کنند که این رهنمود در سایر زندان‌های ایران نیز اجرا شود.

کلمات کلیدی. زندان؛ سل؛ اچ.آی.وی؛ بیماریابی فعال؛ شاخص‌های کشوری.

^۴ Directly Observed Therapy (DOT)