

بسم الله الرحمن الرحيم

راهنمای کاربردی زمان لازم جهت قطع داروهای
دامپزشکی و افزودنی ها قبل از کشتار مرغ گوشتی
(برای جلوگیری از باقیمانده دارویی در گوشت مرغ)

گردآوری و تدوین : دکتر مهدیه سادات کرمی

عنوان کتاب: راهنمای کاربردی زمان لازم جهت قطع داروهای دامپزشکی و افزودنی ها

قبل از کشتار مرغ گوشتی (برای جلوگیری از باقیمانده دارویی در گوشت مرغ)

گردآوری و تدوین: دکتر مهدیه سادات کرمی

ویراستار علمی: دکتر اسماعیل رهدار

ناشر: جام اندیشه

تایپ و صفحه آرایی: نازنین میرزائزاد - عاطفه سلطان محمدی

طراحی جلد: داود جواهری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: ۱۳۸۳

قیمت: ۲۵۰۰ ریال

چاپ و لیتوگرافی: تکنوچاپ

شابک: ۹۶۴-۹۴۴۶۲-۸-۱

کرمی، مهدیه سادات
راهنمای کاربردی زمان لازم جهت قطع داروهای
دامپزشکی و افزودنی های قبل از ارسال طیور گوشتی
به کشتارگاه (جهت جلوگیری از باقیمانده دارویی)/
تدوین و گردآوری مهدیه سادات کرمی، ویراستار
علمی اسماعیل رهدار، -تهران: جام اندیشه، ۱۳۸۳
۱۶ ص: جدول.

ISBN 964-94462-8-1: ۲۵۰۰ ریال

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

۱. داروهای دامپزشکی - ته مانده ها. ۲. مرغهای

گوشتی. الف. عنوان. ب. عنوان: زمان لازم جهت قطع

داروهای دامپزشکی افزودنی های قبل از ارسال طیور

گوشتی (برای جلوگیری از باقی مانده دارویی).

۲ ک RA۱۲۷۰/د ۶۳۶/۰۸۳۲

کتابخانه ملی ایران ۸۳-۳۲۳۴۷ م

مقدمه

دولت ها برای اطمینان بخشیدن به ملت خود از جهت سلامت غذای مصرفی شان نیازمند برنامه های کنترل قانونی هستند. ویژگی های یک برنامه کنترل باقیمانده دارو از روی اهمیت مخاطرات متعدد بهداشتی که برای مصرف کنندگان غذاهای با منشأ دامی دارد، مشخص می شود.

یکی از خطرات موجود در دامهای تولیدکننده غذا، دریافت بیش از حد داروهای دامی یا سموم آفت کش است که باعث می شود میزان نامطلوبی از باقیمانده این مواد شیمیایی در فرآورده های خوراکی حاصل از آنها وجود داشته باشد.

سلامت غذای انسان مستلزم این است که اولاً، یک ارزیابی کاملاً علمی از خطرات نسبی مانند مقدار باقیمانده داروها در بافت های خوراکی دام و طیور درمان شده صورت پذیرد و ثانیاً، روش های سیستماتیکی برای اطمینان از انجام کنترل مؤثر و کارآمد عدم حضور این باقیمانده ها در غذا وجود داشته باشد.

استانداردها و حدود مجاز باقیمانده آفت کش ها و داروهای دامی در غذای انسان و خوراک دام ماحصل یک سلسله توافق ها و همکاری های گسترده بین المللی است که این معیارها با حدود توصیه شده توسط WHO و FAO به عنوان بهترین معیارهای تضمین حفظ سلامت مصرف کنندگان و تسهیل تجارت بین المللی غذا، سازگاری و هماهنگی دارد.

با بکارگیری روش های درست کاربرد داروهای دامی میزان حداکثر مجاز باقیمانده داروها کاهش می یابد. میزان حداکثر مجاز باقیمانده داروها (MRL= Maximum Residue Limit) اصولاً بر مبنای نوع و مقدار باقیمانده که برای سلامتی انسان فاقد مخاطرات سمی است و با محاسبه سایر مخاطرات بهداشت عمومی که در آن منظور شده باشد تعیین می شود.

گروه اطلاع رسانی IRAN PHARMA VET. این مجموعه را با همکاری کارشناسان محترم سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسؤولین محترم فنی شرکت های دارویی دامپزشکی و با هدف آگاهی دامپزشکان از زمان لازم جهت قطع داروهای دامپزشکی (WdTV=Withdrawal Time of Veterinary Drugs) و افزودنی ها قبل از ارسال طیور گوشتی به کشتارگاه گردآوری و تدوین نموده است تا راهنمای علمی- کاربردی مناسبی برای رعایت قبل از عرضه و مصرف انسانی گوشت مرغ باشد.

در خاتمه از کلیه عزیزانی که در به نمر رسیدن این مجموعه نگارنده را یاری نموده و در ارتقاء کیفیت ظاهر و باطن آن کوشیده اند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

دکتر مهدیه سادات کریمی

پاییز ۱۳۸۳